

SinerPac

Vet

COMPOSICIÓN:

Cada 1000 g contienen:

 Florfenicol.....250 g
 Excipiente c.s.p.....1000 g

DESCRIPCIÓN:

SinerPac Vet es un antibiótico de amplio espectro a base de florfenicol. Actúa como un bacteriostático, a través de la interferencia de la síntesis proteica de las bacterias a nivel ribosomal. Se administra para el tratamiento de las infecciones respiratorias y digestivas causadas por gérmenes sensibles a la fórmula.

INDICACIONES:

SinerPac Vet es indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias y digestivas en aves y cerdos causadas por microorganismos Gran positivos y Gran negativos tales como:

Pasteurella, Salmonella, E. coli y Staphylococcus Aureus.

DOSIS:

Espezie	Edad	Dosis (15-30 mg Florfenicol/kg pv dia)	Duración
AVES	Alimento	1-2 kg S/T.M. (25-50 ppm)	7 días
	21	2-3 kg S/T.M. (50-75 ppm)	7 días
CERDOS	Aqua	Todas	15 - 30 mg Florfenicol/ kg pv dia
	Alimento	Todas	2 - 3 kg S/T.M. (50-75 ppm)
	Aqua	Todas	15 - 30 mg Florfenicol/ kg pv dia

Otras dosis y tiempo de tratamiento quedan a criterio del médico veterinario

PERÍODO DE RETIRO:

Aves: 5 días, Cerdos: 28 días.

Vía de Administración: Oral, mezclado con el alimento o con el agua de bebida.

PREPARACIÓN

Administrar directamente en el alimento o agua de bebida. El agua medicada debe ser proveída como la única fuente de bebida durante el tratamiento y debe ser preparada cada día. La mezcla debe hacerse en forma lenta y con agitación continua para asegurar una buena homogenización.

ADVERTENCIA:

- No usar en aves de postura comercial.
- Respetar las dosis y las especies recomendadas.
- No suministrar el producto directamente, mezclar con el alimento o agua de bebida.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Conservar en lugar fresco y seco, no mayor a 30°C.
- Venta bajo prescripción médica.

CONTENIDO NETO
 Envase de 1 kg

ALMACENAMIENTO:

El periodo de vida útil es de doce meses, almacenado a temperatura ambiente a 25°C +/- 3°C y una humedad relativa de 60% +/- 5%.

REGISTRO N°: RIP-FAR-63
